


SUSPEITA DE SEPSE

TAREFAS CRÍTICAS UNIDADE DE INTERNAÇÃO

Médico

- Iniciar o protocolo na suspeita de sepse
- Comunicar ao enfermeiro a abertura do protocolo de sepse
- Prestar atendimento ao paciente em acordo com o protocolo de sepse do HMDCC

Enfermeiro

- Acionar o laboratório nos ramais **4305** ou **4377** e Farmácia Central no ramal **3220** 
- Garantir que as culturas e exames do pacote de sepse sejam coletados e o resultado da gasometria arterial e lactato sejam liberados em até 30 minutos
- Garantir que o antibiótico chegue até o setor em até 15 minutos. Caso o antibiótico não chegue em 15 minutos, ligar novamente para a Farmácia Central e aguardar mais 15 minutos. Após este período máximo de 30 minutos, solicitar ao Técnico de Enfermagem que retire o antibiótico na Farmácia Central e que este seja administrado no paciente em até 1 hora da abertura do protocolo
- Notificar **“Evento Adverso”** para cada quebra de pactuação ou falha de processo no protocolo de sepse
- Prestar atendimento ao paciente em acordo com o protocolo de sepse do HMDCC

Técnico de Enfermagem

- Retirar antibiótico na Farmácia Central se o mesmo não chegar ao setor em até 30 minutos
- Administrar o antibiótico no paciente em até 1 hora da abertura do protocolo
- Prestar atendimento ao paciente em acordo com o protocolo de sepse no HMDCC